

# 農事普及だより

（6月号 令和2年6月1日～6月30日）

（発行） 鶴田町／鶴田町農業支援センター／鶴田町産業課  
つがるにしきた農業協同組合鶴翔統括支店  
西北地域県民局地域農林水産部農業普及振興室  
（編集） 西北地域県民局地域農林水産部農業普及振興室

## \*気象\*

（令和2年5月21日 仙台管区気象台発表  
東北地方1か月予報より）

暖かい空気に覆われるため、向こう1か月の気温は高いでしょう。期間の前半は気温がかなり高くなる見込みです。向こう1か月の平均気温は、高い確率60%です。

## \*水稻\*

きめ細かな水管理で生育促進に努めよう！

### 1. 水管理

分けつ（茎数の増加）の適水温は、日最高で30～32℃、日最低で15～17℃、日較差15℃前後である。日平均水温が19℃以下になると分けつの発生が少なくなるため、昼間止水・夜間かんがいを基本とし、暖かい日は浅水で水温を上昇させ、寒い日は葉先が冠水しない程度のやや深水で保温する。また、漏水防止に努め、掛け流しはしない。

有効茎数（1株茎数で「青天の霹靂」は18本程度、その他の品種は20本程度）を確保した水田では、6月末頃から高温（平均気温が20℃以上）で晴天が続くようであれば中干しを行う。中干しは田面に軽く亀裂が入る程度とする。

### ■ 水管理の目安

生育期	暖かい日	寒い日
分けつ期	3cm程度の浅水	5～6cm程度の深水
有効茎数確保後	中干し	5～6cm程度の深水

### 2. 雑草防除

#### (1) 初期＋中期の体系処理の場合

- 初期剤使用後20日頃を目安に中期剤を散布する。除草剤の散布後は、除草効果の維持と水質汚染防止のため、散布後7日間は止水し、落水や掛け流しをしない。
- 一発剤を使用し、残草が見られた場合**  
残った草種に応じて除草剤を散布する。除草剤は使用基準を必ず守り、他の作物に飛散しないように注意する。

#### ■ 残った草種別に使用できる除草剤の例

- ⑦ 広葉雑草（アゼナ・ホタルイ等）のみ → バサグラン液剤・粒剤
- ⑧ ノビエのみ → クリンチャー1キロ粒剤・EW  
又はヒエクリーン1キロ粒剤  
又はワンステージ1キロ粒剤
- ⑨ 広葉雑草 ＋ ノビエ → クリンチャーバスマE液剤

### 3. 病虫害防除

#### (1) イネミズゾウムシ

移植前や移植時に防除をしなかった場合は、発生に応じて防除し、発生が多い場合は、6月上旬に水面施用剤を散布する。この時期の防除でイネドロオイムシも防除できる。

#### (2) 斑点米カメムシ類

カメムシの発生源となっている水田周辺の休耕田や、カメムシを誘引する畦畔の雑草（主にイネ科雑草）は、開花・結実する前に刈り取る。また、雑草の刈取りは水稻の出穂2週間前（7月中旬頃）までに終了する。

#### (3) 葉いもち

取り置き苗は、葉いもちの発生源となるので、補植が終わったら、直ちに処分する。葉いもちは、早い年には6月下旬に発生がみられるので、ほ場をこまめにチェックし、病斑が見られた場合には、航空防除まで待つのではなく、直ちに防除する。復元田や、いもち病に弱い品種を作付けした場合は、葉いもちの発生が見られなくても、水面施用剤による予防防除を必ず行う。水面施用剤（オリゼメートを含む水面施用剤、オリブライトを含む水面施用剤、アイゲット粒剤）は、6月20日前後から6月末まで（中干し1週間前を目安）に湛水のまま施用する。施用後1週間は止水し、落水、掛け流しをしない。その間の入水は、水尻を止めたままで行う。

※ 「青天の霹靂」は、農業の成分使用回数を地域慣行の1/2以内とすることが必須なので、農業の使用に際しては成分数を確認する。

## 畑作

大豆の雑草防除と中耕・培土をしっかりと行おう！  
小麦の赤かび病の適期防除に努めよう！

## \*大豆\*

### 1. は種

砕土が粗いと発芽率が劣るので、砕土はていねいに行う。は種量は「おおすず」で7kg/10aを基準とする。は種直後の多雨は、出芽や初期生育の不良を招くので、気象情報に注意しながら作業する。は種作業は6月10日頃までに終えるようにする。やむを得ず、は種が遅れる場合は畦幅や株間を詰めて、は種量を増やす。

### 2. 雑草対策

#### (1) 土壌処理剤

土壌処理剤は、ほ場表面の水分が低いと効果が劣るので、は種後速やかな散布が望ましい。また、出芽した雑草には効果がないので注意する。

#### (2) 茎葉処理剤

イネ科雑草用の茎葉処理剤は、薬剤により効果が異なるので発生状況に合わせて選択し、効果的に使用する。広葉雑草に使用できる茎葉処理薬剤は大豆バサグラン液剤とアタックショット乳剤がある。両剤とも「薬害と収量に及ぼす影響及び除草効果の注意書き」を確認のうえ使用する。散布回数はいずれも1回なので、大豆の茎葉がうね間を覆う前に使用する。

#### (3) 畦間処理

土壌処理、茎葉処理で残草が多い場合は、畦間処理の除草剤が利用できる。ただし、大豆に薬剤が飛散しないよう、専用ノズル、カバー等を使用する。

#### (4) 中耕・培土

- 1回目：本葉2～3葉期  
初生葉のつけ根まで軽く土寄せする。
- 2回目：本葉5～6葉期  
第1本葉のつけ根まで土寄せする。

## \*小麦\*

### 1. 病虫害防除

#### (1) うどんこ病、赤さび病

早期発見に努め、発生初期での防除に努める。薬剤は下葉にも十分付着するように散布する。

#### (2) 赤かび病

開花期から乳熟期にかけて、気温が高く湿潤な天気が続くと発生が多くなる。出荷製品に混入すると、人畜に有害なかび毒（デオキシニバレンール）を生産し、下痢や嘔吐などの中毒症状を起こす場合があるため、出荷できない。防除は、開花始め～開花期に1回目、その7日後に2回目の薬剤散布を行う。

### 2. 収穫作業

#### (1) ネバリゴシ

出穂後46～50日、出穂後積算温度830～950℃、子実水分25%を目安とする。

#### (2) キタカミコムギ

出穂後51～55日、出穂後積算温度900～1,000℃、子実水分25%を目安とする。穂発芽しやすいので、天候しだいでは水分30%での刈取りが必要になる。この場合は速やかに乾燥機に張り込み、水分25%までは送風温度を40℃以下にして品質低下を防ぐ。

## \*りんご\*

良果を見極め、早期適正着果で  
高品質果実生産に努めよう！

黒星病徹底防除推進期間中（4月～6月）的確な防除を行おう！

### ■ りんごの生育ステージ

品種名	板柳町五畿形（月/日）					
	区分	発芽日	展葉日	開花日	満開日	落花日
ふじ	本年	3/30	4/13	5/5	5/11	5/16
	平年	4/9	4/19	5/9	5/14	5/19
	前年	4/6	4/18	5/6	5/10	5/15
	平年比	10日早	6日早	4日早	3日早	3日早
つがる	本年	3/27	4/18	5/5	5/10	5/14
	平年	4/8	4/20	5/8	5/13	5/18
	前年	4/6	4/19	5/5	5/10	5/15
	平年比	12日早	2日早	3日早	3日早	4日早
ジョナゴールド	本年	3/26	4/6	5/4	5/10	5/13
	平年	4/6	4/15	5/6	5/12	5/17
	前年	4/2	4/15	5/5	5/9	5/14
	平年比	11日早	9日早	2日早	2日早	4日早
王林	本年	3/28	4/11	5/3	5/9	5/13
	平年	4/6	4/16	5/6	5/11	5/16
	前年	4/5	4/17	5/3	5/9	5/14
	平年比	9日早	5日遅	3日早	2日早	3日早

### ■ 標準的な着果程度

品種	摘果の強さ（残す果実）	着果率（%）
紅玉	3 頂芽に1果	33
つがる・ジョナゴールド	3.5 頂芽に1果	29
ふじ・王林・早生ふじ・トキ・シナノゴールド・きおう・金星・シナノスイート・未希ライフ・ぐんま名月・さんざ・春明21・星の金貨・千雪・夏緑・恋空・祝・花祝	4 頂芽に1果	25
北斗	4.5 頂芽に1果	22
陸奥・世界一	5 頂芽に1果	20

### 2. ヒオモン水溶剤によるふじ・早生ふじのつる割れ防止対策

開花が早く、大玉になりやすい年や例年つる割れの多い園地では、ヒオモン水溶剤の利用も検討する。

### ■ ヒオモン水溶剤の使い方

品種名	使用目的	使用時期	本剤の使用回数	成分総使用回数	希釈倍数	10a当たりの散布量	備考
ふじ 早生ふじ	つる割れ軽減	満開20日～30日後	1回	3回以内	3,000倍	300～600ℓ	展着剤不要 有効成分： 1-ナフタレン酢酸ナトリウム 4.4%

注) 1 本剤は単用散布とする（展着剤は使用しない）。  
2 散布後に葉がしおれる症状（エピナスティ）を示すが、1週間後にはほぼ回復する。  
3 高温、乾燥時の散布は避ける。新梢先端葉及び樹冠内の果そう葉の黄変落葉や頂芽の欠落が発生した事例がある。  
4 極端に樹勢の弱い樹への散布は避ける。  
5 果実肥大が抑制される場合がある。  
6 新梢の二次伸長を助長する場合がある。  
7 摘果剤（マイクロデナボン水和剤85）を散布した後に本剤を使用した場合、摘果剤の効果が抑制される。

### 3. 病虫害防除

黒星病の被害葉・被害果は見つけたい摘み取り適正に処分する。また、感染拡大を防ぐため6月いっぱいには10日間隔での薬剤散布を徹底する。薬剤散布に当たっては、散布量を節約せず適量を散布する。なお、散布予定日に降雨が予想される場合は前倒して散布する。

### 4. 追肥

追肥を計画している場合は6月末までに終える。施肥量は結実量と樹勢に応じて1樹ごとに加減する。

## 5～8月は「農業危害防止運動」実施期間です

農業の適正使用と隣接農地への飛散防止に十分気をつけましょう！

- 使用し残った農業などは、河川等へ絶対捨てないでください。
- 農業を使用する場合には、必ず最新の「農業登録情報」を確認してください。
- 農業は鍵のかかる専用の場所に保管し、管理を徹底しましょう。

## 特産果樹

## \*ぶどう\*

スチューベン（鶴田町境）の展葉日は5月9日で、平年並であった。

5月18日現在、スチューベンの開花予想は6月21日ではほぼ平年並！  
**< 開花予想は最新版で差し替えします >**  
摘梢は適期に行い、樹勢に応じた摘心を心がけよう！

### 1. 新梢の誘引・結束

薬剤や日光の通りを良くするため、新梢は随時角度や間隔を調整しながら架線に誘引し、結束する。

### 2. 摘心（1回目）

1回目の摘心は開花7日前頃に行い、品種や樹勢に応じて強さを調整する。

品 種	摘心部	樹勢	副梢の取り扱い
ス チュー ベ ン	第1花穂の上位5枚	強・中	①すべての副梢をかき取り、その後発生した先端の副梢を1本残す ②上位1本の副梢を残し、下位はかき取る ※①か②を選択する
		弱	上位2本の副梢を残し、下位はかき取る
		第1花穂の上位3～4枚	上位2本の副梢を残し、下位はかき取る
キャンベル・アーリー	第1花穂の上位3～4枚	上位2本の副梢を残し、下位はかき取る	
サニールージュ シャインマスカット	第1花穂の上位5枚	上位1本の副梢を残し、下位はかき取る	
ポートルランド ナイアガラ	第1花穂の上位4～5枚	上位2本の副梢を残し、下位はかき取る	

### 3. 花穂の整形

花穂整形時期は、開花5日前頃から1～2花咲き始める時が適期である。スチューベン、ポートルランド、ナイアガラでは、花穂の岐肩（通称：カタ）のみを除去する。キャンベル・アーリーでは、花穂の岐肩、岐肩下の長い支梗や軸の間隔が広いものを除去し、さらに花穂の先端も軽く切り詰める。シャインマスカットは、岐肩と上部支梗を除去し、花穂の先端4cmを残す。花穂整形器を利用するとハサミに比べて整形作業時間が短縮される。

### 4. シャインマスカットの無核栽培

シャインマスカットの無核栽培では無種子化を確実にするため、ストレプトマイシン処理を行ってからジベレリン及びフルメット処理を行う。

#### (1) ストレプトマイシン処理

満開予定日14日前～開花始期にストレプトマイシン200ppm溶液を花房に散布または浸漬する。

#### (2) ジベレリン及びフルメット処理

⑦ 無核3回処理の場合（ジベレリンは2回処理）  
1回目は無種子化のために、満開時～満開3日後にジベレリン25ppm溶液に5ppmのフルメット液剤を加用した溶液に花房浸漬する。処理適期は、花穂先端まで咲ききったときである。  
2回目は果粒肥大促進のために、満開10～15日後にジベレリン25ppm溶液に果房浸漬する。

⑧ 無核2回処理の場合（ジベレリンは1回処理）  
満開3～5日後（落花期）に、ジベレリン25ppm溶液に10ppmのフルメット液剤を加用した溶液を花房浸漬する。


### 5. シャインマスカットの予備摘粒

#### (1) 予備摘粒

無核3回処理の2回目（ジベレリン25ppm＋フルメット液剤5ppm）処理日から5～7日後頃に、果房の軸長を6cmに調整する。その際、果房の内側（軸の方向）に向けた果粒を優先して摘粒し、小粒や障害果も摘粒する。軸長は、最上部2支梗（できるだけ対になるように残す）の基部から先端部（果梗は含めない）までの長さを計測して調整する（右図）。

#### (2) 仕上げ摘粒

最上部2支梗の果粒は上向きも含めて各4～5粒残し、これ以下の支梗の果粒は果房形、果粒の配置を整えるため、外向きの果粒が等間隔となるように摘粒する。仕上げ摘粒により着粒数は40～50粒とする。





## 6. 病害虫防除

### ■ 薬剤散布

(スチューベン)

散布時期と 10a当たり散布量	基準薬剤名と倍数			
	殺菌剤		殺虫剤	
開花10日前 6月上旬 (250リットル)	アリエッティC水和剤	800倍	ベストガード水溶剤	1,000倍
	又はキノンドー水和剤40	600倍	又はバダンSG水溶剤	1,500倍
	又はインターフロアブル	8,000倍	又はアグロスリン水和剤	2,000倍
	又はオンリーワンフロアブル	2,000倍	又はアディオフロアブル	1,500倍
開花直前 6月中旬 (250リットル)	アリエッティC水和剤	800倍	ベストガード水溶剤	1,000倍
	又はゲッター水和剤	1,500倍	又はバダンSG水溶剤	1,500倍
落花直後 6月下旬 (250リットル)	ロブラール水和剤	1,500倍	アグロスリン水和剤	2,000倍
	又はポリペリン水和剤	1,000倍	又はアディオフロアブル	1,500倍
	又はスイッチ顆粒水和剤	2,000倍	又はジノテフラン剤※	2,000倍
	又はフルピカフロアブル	2,000倍		

※ジノテフラン剤：スタークル顆粒水溶剤、アルバリン顆粒水溶剤

- 注) 1 灰色かび病の発生が多い圃地では、開花直前にゲッター水和剤を選択する。  
2 ペと病の発生が多い圃地では、開花10日前にアリエッティC水和剤又はキノンドー水和剤40、開花直前にアリエッティC水和剤を選択し、落花直後にランマンフロアブル2,000倍又はライメイフロアブル4,000倍も使用する。  
3 黒とう病の発生が多い圃地では、開花直前にアリエッティC水和剤、落花直後にポリペリン水和剤を選択する。

(シャインマスカット(露地栽培))

散布時期と 10a当たり散布量	基準薬剤名と倍数			
	殺菌剤		殺虫剤	
新梢伸長期 (約30cm) 6月上旬 (200リットル)	ジマンダイセン水和剤	1,000倍		
	又はインターフロアブル	8,000倍		
	又はオンリーワンフロアブル	2,000倍		
開花10日前 6月中旬 (250リットル)	アリエッティC水和剤	800倍	ベストガード水溶剤	1,000倍
			又はバダンSG水溶剤	1,500倍
開花直前 6月下旬 (250リットル)	アリエッティC水和剤	800倍	ベストガード水溶剤	1,000倍
			又はバダンSG水溶剤	1,500倍
開花直前 6月下旬 (250リットル)	ロブラール水和剤	1,500倍	アグロスリン水和剤	2,000倍
			又はアディオフロアブル	1,500倍
			又はジノテフラン剤※	2,000倍

※ジノテフラン剤：スタークル顆粒水溶剤、アルバリン顆粒水溶剤

注) ペと病の発生が多い圃地では、落花直後にランマンフロアブル2,000倍又はライメイフロアブル4,000倍も使用する。

## \*おとうと\*

佐藤錦(鶴田町喜蒲川)の満開日は5月3日で平年より2日早く、落花日は5月16日で平年並であった。

早めの摘果と適期防除で品質向上に努めよう!

### 1. 裂果防止対策

雨よけハウスの被覆は着色が始まる直前に行い、裂果防止に努める。

### 2. 着色管理

- (1) **葉摘み**  
果実の着色がある程度進んだ頃(おおむね収穫予定の7~10日前頃)から行き、果実に直接かぶさっている葉を軽く摘み取る。過度の葉摘みは果実品質を低下させたり、翌年の花芽の充実不足、樹勢の低下を招くおそれがあるので、**摘み取る量は最小限にとどめる。**
- (2) **サンキャッチ液剤30Sの利用**  
着色促進のためサンキャッチ液剤30Sを利用する場合は、以下により使用する。

#### ■ サンキャッチ液剤30Sの使用方法

対象品種	佐藤錦、南陽
処理方法	600倍液を立木全面散布
処理時期	収穫開始14日前(着色が樹全体の2~3割頃)と7日前の2回
散布量	300リットル/10a

- 注) 1 散布直後降雨は効果を減じるので、晴天日に散布する。  
2 樹冠内部が暗いと効果が劣るので、樹冠内部の明るさを適正に保つ。  
3 展着剤は不要である。  
4 他の薬剤と混用せず、単用で用いる。



農薬はぶどう園以外、他の作物、近隣の住宅等に飛散させない。

## 3. 病害虫防除

### ■ 薬剤散布

散布時期と 10a当たり散布量	基準薬剤名と倍数			
	殺菌剤		殺虫剤	
満開35日後 6月上旬 (500リットル)	アミスター10フロアブル	1,000倍	テルスターフロアブル	4,000倍
	又はファンタジスタ顆粒水和剤	3,000倍	又はエクシレルSE	2,500倍
	又はナリアWDG	2,000倍		
	又はアンビルフロアブル	1,000倍		
	又はオンリーワンフロアブル	2,000倍		
収穫前【佐藤錦】 6月中~下旬 (500リットル)	アミスター10フロアブル	1,000倍	スカウトフロアブル	3,000倍
	又はナリアWDG	2,000倍	又はエクシレルSE	2,500倍
	又はインターフロアブル	5,000倍		
収穫前【晩生種】 7月上旬 (500リットル)	アミスター10フロアブル	1,000倍	スカウトフロアブル	3,000倍
	又はナリアWDG	2,000倍	又はテルスターフロアブル	4,000倍
			又はエクシレルSE	2,500倍

注) 1 満開35日後頃に、紅さやかなどの早生種に散布する場合、収穫前日数に注意して薬剤を選択する。  
2 カメムシ類対策では、満開35日後や収穫前に発生がみられた場合は、テルスターフロアブルを選択する。  
3 収穫前にアウトウシヨウジョウバエ対策でスカウトフロアブルを使用するとカメムシ類防除剤は必要ない。  
4 アンビルフロアブル、オンリーワンフロアブル、インターフロアブルは、薬剤耐性の懸念があるので連続使用しない。  
5 アミスター10フロアブル、ファンタジスタ顆粒水和剤、ナリアWDGは、薬剤耐性の懸念があるので、合わせて年2回以内の使用とする。ただし、アミスター10フロアブルとファンタジスタ顆粒水和剤は連続使用しない。

### 4. 収穫

収穫は満開日からの日数が目安になるが、天候によっては早まることもあるので、品種の特性(着色、大きさ、形状、食味など)を重視し、成熟したものを順次、数回にわたって行う。

#### ■ 各品種の収穫期

品 種	満開日から収穫日までの日数
紅 さ や か	40~50日
佐 藤 錦	50~55日
ジュノハート	55~60日
紅 秀 峰	60~70日
サ ミ ッ ト	60~65日
南 陽	60~65日

## \*野菜\*

## トマト

### 1. 定植後の管理

ハウス内の温度は昼間25℃前後で管理する。高温障害が発生しやすいため、天候によりサイド換気や肩換気を行う。

気温が低下する日や夜間はサイドを閉め、保温に努める。夜間は14℃以上を目標とする。6月中旬以降、最低気温が14℃以上になれば、夜間でもサイドを解放する。

### 2. 着果の促進

トマトーン処理は、なるべく気温の低い午前中に行う。低温時(20℃以下)50倍、高温時(20℃以上)100倍の濃度で、1花房当たり1~1.5cc噴霧する。  
1~4段花房は4番花開花始め、5段花房以降は3~4番花開花始めに行い、散布回数は1花房1回とする。

### 3. かん水と追肥

試しかん水は、2段花房のトマトーン処理後に1株当たり1リットル程度を目安に行う。  
本格的なかん水と追肥は、3段花房のトマトーン

## メロン

### 1. 温度管理

定植後は最高気温28~30℃、開花期は最低気温12~15℃を目安に、トンネルの開閉などでこまめな温度・湿度管理を行う。特に夜間の閉めきりは軟弱徒長となり、病害虫の発生の原因となるので、こまめな開閉を心がける。(外気の最低気温15℃以上なら夜間開放)

## 2. かん水

開花期のかん水は、湿度の上昇により花粉が出にくくなるので控える。  
着果確認後(鶏卵大の頃)から着果2週間後頃までかん水を行う。1回の量は、株当たり4リットルが目安となるが、土壌水分により加減する。  
草勢(つる先の立ち上がり、葉色、孫づるの伸長)を見て、液肥や葉面散布を行う。

### 3. 摘心と整枝

- (1) **結果枝(孫づる)の摘心**  
⑦ **弱勢の場合** 着果節位を1~2節上げ、着果確認後に、孫づるの葉1枚を残し、摘心する。  
⑧ **適勢の場合** 開花前後に孫づるの葉1枚を残し摘心する。  
⑨ **強勢の場合** 開花予定日の3~4日前に孫づるの葉1枚を残し、摘心する。
- (2) **結果枝以外の整枝**  
22~23節で子づるを摘心する。15~20節の孫づるを除去する。  
整枝は着果後10日までに終了し、風通しを良くし、ネットの形成を促進する。  
果実肥大期は、受光体勢を維持するため、茎・葉を動かさないようにする。

## \*花き\*

適正な温度管理により高品質な花きの生産に努めよう!

## キク

### 1. 定植前後の管理

採種に当たっては、太さが揃い充実したものを選択し、定植2週間前から挿し芽を行う。10月出荷の作型は、6月上旬~下旬に定植できるように作業を進める。  
挿し芽後は十分かん水する。5月以降の日照が強い時期は、遮光率50%程度の資材を発根まで被覆して日中のしおれを防ぐ。  
定植後の管理について、花芽分化期までにいかに草丈を伸ばすかが、良品質切り花生産にとって重要であるので、定植後1.5か月くらいは十分にかん水する。なお、温度は、日中25℃以下を目標に管理する。

### 2. 病害虫防除

白さび病、アブラムシ類、アザミウマ類及びハモグリバエ類の早期発見・早期防除に努める。また、オオタバコガやヨトウムシ類の侵入を防ぐため、ハウスのサイドや出入口等に防虫ネットを早めに設置する。

## トルコギキョウ

### 1. 定植作業

10月出荷の作型では、6月下旬頃までに定植する。老化苗は生育が劣るので、本葉が4枚展開までのものを使用する。  
高温時の定植では、定植1週間前から遮光率40%程度の遮光資材を用いて地温を下げおき、活着を確認したら曇天または夕方に被覆資材を除去する。  
定植は深植えとせず、株元を強く押さえないようにする。

### 2. 定植後の管理

気温25℃以上が続くと生育の停滞やロゼットの要因となるので、遮光や換気等で温度管理を徹底し、発蕾までは乾燥させないように管理する。  
分枝が低節位から発生した場合は、主茎促進のため、5節まで(草丈15cmまで)のものを早めに摘み取る。

### 3. 病害虫防除

上記キクを参照

## りんどう

### 1. フラワーネット張り

早生種、中生種(ながの2号、しなの極早生等)は2段張りでも良いが、晩生種(しなの2号、しなの3号等)は3段張りとする。  
5月以降は生育が旺盛になるため、できるだけ早く張り、こまめに引き上げる。

### 2. 追肥

側芽が発生し始めた頃(開花のおよそ60日前)に成分で窒素：リン酸：加里=4：4：4kg/10a程度を基肥同様に株元から離れた部分に施用する。

#### ■ 品種ごとの開花目安と追肥時期

品 種	6月	7月	8月	9月	10月
ながの2号	◎				
スカイブルーしなの早生		◎			
しなの2号		◎			
しなの3号			◎		
しなの4号				◎	

◎ 追肥時期    ■ 開花期

町農業委員会では、毎年6月中旬から農地パトロールを実施し、遊休農地や、放任園等の発生防止に取り組んでいます。  
農地の貸借や売買については、町農業委員会へご相談ください。

【農業の相談はこちらへ】  
農業についての各種相談を受け付けております。受付した内容は即時対応いたしますので、気軽にご相談ください。  
鶴田町農業支援センター 午前9時から午後5時 ☎22-2111 (役場産業課)

~農事普及だよりは町ホームページにも掲載しております~  
URL <http://www.town.tsuruta.lg.jp/kurashi/kurashi-nougyou/post-117.html>